

# Avertissements agricoles

Publication périodique

EDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 30

16 OCTOBRE 1986

COLZA : - Continuez à surveiller le charançon du bourgeon terminal  
CEREALES : - Attention aux pucerons

## CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL : - COLZA -

- Le vol se poursuit en Champagne Berrichonne (Rians, Soye-en-Septaine, Bourges, Méry-ès-Bois -18-) et a débuté en petite Beauce du Loiret (Cravant). Restez vigilant dans les autres secteurs.
- Rappelons qu'il convient de traiter 10 à 15 Jours après les premières captures. Traitement possible entre le 15-20 Octobre pour la Champagne Berrichonne et du 18 au 24 octobre pour la petite Beauce du Loiret.

## GROSSES ALTISES :

- Toutes les parcelles ont maintenant dépassé le stade de sensibilité aux morsures, toutefois, s'il n'est pas le cas, se reporter au bulletin n° 29 du 09 Octobre 1986.

## PUCERONS CENDRES :

- Ces pucerons sont observés en toutes régions. Ils provoquent des jaunissements et une crispation du feuillage. Contrôlez les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4-5 feuilles. En effet, sur colzas peu développés, ils peuvent causer de graves dommages. Si une plante sur cinq porte de grosses colonies, un traitement à base de parathion (250 g de parathion-éthyl ou 300 g de parathion méthyl/ha) se justifie. Ce produit contrôlera en même temps les altises.

## MILDIOU :

- Actuellement quelques cas ont été signalés en Indre-et-Loire, Eure-et-Loir et Loiret. A la face inférieure des feuilles apparaissent de petites taches se recouvrant d'un feutrage grisâtre. Les rosées et brouillards sont favorables à cette maladie.

Abonnement annuel : 125 F - Chèque à l'ordre du Régisseur de Recettes

à envoyer à l'adresse ci-dessous.

### MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

#### SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tél. 38 86.36.24

EDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant : A. SIMONIN

CPPAP N° 530AD



783

- CEREALES -

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE :

• Un vol intense a été enregistré du 15 Septembre au 14 Octobre, le refroidissement de la nuit dernière a ralenti les captures. Cependant des pucerons s'observent sur maïs, repousses et jeunes semis de toute la région CENTRE.

→ Surveillez vos cultures et traitez à partir du stade 1 feuille, si vous observez, en fin d'après-midi, une plante sur cinq colonisée par un ou plusieurs pucerons. Ce seuil est largement dépassé dans bon nombre de parcelles levées.

Produits utilisables :

MATIERES ACTIVES	SPECIALITE COMMERCIALE	FIRME	DOSE EN LITRE/HA DE P. C.
permethrine	AMBUSH	La Quino	0,25
fluvalinate	MAVRIK	Sandoz	0,2
fenvalerate	SUMICIDIN 10	Agrishell	0,25
deltamethrine	DECIS CE	Procida	0,3
cypermethrine	CYMBUSH	Sopra	0,2
	KAFIL SUPER	La Quino	0,2
	SHERPA 10	Pépro	0,25
	MASTOR	Agrishell	0,4
cyfluthrine	BAYTHROID	Bayer France	0,3
cyhalothrine	KARATE	Sopra	0,15
Bromophos	NEXION 25	BASF	1,5
	NEXION 40	BASF	1,00
	RHODIANEX	Rhodiagri	1,5
biphenthrine	TALSTAR	Pépro	0,075
alphamethrine	FASTAC	Agrishell	0,2

Sur les cultures traitées avant le stade 2-3 feuilles et si le temps doux continue, il sera souhaitable de reprendre la surveillance au bout de 8-10 jours.

NE PAS HESITER A RENOUELER LA PROTECTION.

Des tests sont actuellement pratiqués par notre laboratoire de Fleury-les-Aubrais pour contrôler le pouvoir virulifère des pucerons.